

Tanacetum ZB

Herbal oral drop

تاناستوم ZB

قطره خوراکی

گیاه تاناستوم یا بابونه گاو چشم از دیرباز به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند مطرح بوده است. امروزه از این گیاه در پیشگیری و بهبود حملات حاد میگرند، آرتربیت روماتوئید، التهاب، اسپاسم، آمنوره و تیینیتوس (وزوز گوش) استفاده می‌گردد.

این عصاره از سرشاخه گلدار گیاه تاناستوم تهیه شده است. بذر این گیاه توسط زنده یاد دکتر رضا امیدیگی، مدیر وقت تحقیق و توسعه شرکت دارویی زردبند اصلاح شده و به نام رقم زردبند cv. Zardband مخصوص است. عصاره تهیه شده از این گیاه نسبت به ارقام دیگر، حاوی مقدار پارتولیلید بیشتری می‌باشد.

شكل خوراکی:

قطره خوراکی ۰۳۰ میلی لیتری

ترکیبات:

عصاره تاناستوم

محصول استاندارد شده بر اساس حداقل ۷/۰ میلی گرم بر میلی لیتر پارتولیلید

موارد مصرف:

پیشگیری و درمان میگردن

مقدار و نحوه مصرف:

روزانه ۲ تا ۳ مرتبه و هر بار ۱ قطره، در مقداری آب یا آب میوه ریخته و بلافضله میل شود.

موارد منع مصرف:

افراد دارای سابقه حساسیت به گیاهان خانواده کاسنی از مصرف این فرآورده اجتناب نمایند.

از مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) خودداری شود.

احتیاطات و هشدارها:

با توجه به اینکه تاناستوم از تجمع پلاکتها جلوگیری می‌کند از این رو می‌بایست در استفاده همزمان این فرآورده با سایر داروهای ضد تجمع پلاکتی (آنٹی کواگولانت) مانند آسپیرین و دی‌پریدامول جانب احتیاط رعایت شود.

چنانچه قصد توقف درمان و یا ایجاد وقفه در آن را دارید، دوز مصرفی به تدریج کاهش داده شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



www.zardband.com
info@zardband.com

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود.

مکانیسم اثر:

ممانتع از اتمال سروتونین به گیرنده‌اش

گیرنده‌های سروتونین نقش مهمی در فیزیوپاتولوژی میگرن دارند. پارتنولید موجود در این فرآورده آنتاگونیست نسبی گیرنده‌های سروتونین بوده، از اتمال سروتونین به گیرنده‌هایش جلوگیری می‌کند و اثر ضد میگرنی خود را اعمال می‌نماید.

تأثیرات ضد التهابی

سزکویی‌ترین لکتون‌های موجود در این محصول به ویژه پارتنولید با مهار بیان ژن سیکلواکسیژنаз و در نتیجه عدم سنتز پروستاگلاندین‌ها موجب کاهش التهاب می‌گردند.
تأثیر بر پلاکت‌ها

سزکویی‌ترین‌های موجود در این فرآورده به ویژه پارتنولید با خنثی کردن گروه‌های سولفیدریل در درون یا بیرون سلول ترشح سروتونین از پلاکت‌ها را مهار و با جلوگیری از تجمع پلاکت‌ها به پیشگیری از میگرن کمک می‌نماید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و تاریک با دمای محیط (کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد) و در ظرف دربسته محصول نگهداری شود.

شماره ثبت فرآورده: ۳۴۷۹۷۸۱۶۲۱۸۹۷۵۷۱